

## COMBINA 66 SC FUNGICIDA

**INGREDIENTE ACTIVO:** 60g/l AZOXISTROBIN + 600g/l CLOROTALONIL

**FORMULACIÓN:** Suspensión Concentrada (SC)

**GRUPO QUÍMICO:** METOXIACRILATOS + CLORONITRILOS



**RECOMIENDACIONES DE USO:** **COMBINA 66 SC** es un fungicida sistémico y de contacto, de origen natural, con actividad preventiva, curativa y antiesporulante. La combinación de dos ingredientes activos permite controlar un amplio rango de enfermedades en diversos cultivos.

La sistemicidad y la acción temprana sobre las esporas se deben al contenido de azoxistrobina, que inhibe la respiración mitocondrial y actúa sobre la germinación de las esporas y el desarrollo micelial. El clorotalonilo previene la germinación de las esporas, causa la muerte de las células en desarrollo y retarda el crecimiento micelial. El producto posee movimiento acropétalo y translaminar, y protege totalmente las hojas y brotes jóvenes. Se destaca por su persistencia en el cultivo y resistencia al lavado de las lluvias o el riego.

Aplicar por aspersión con cubrimiento foliar homogéneo. Para efecto óptimo tratar las plantas de forma preventiva o 24 - 48 horas después de los primeros síntomas de la enfermedad. Repetir cada 7-10 días, en dependencia del desarrollo de la enfermedad y las condiciones climáticas, con un máximo de tres aplicaciones durante el cultivo. Aplicar la dosis mayor y el intervalo menor en caso de condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad con cualquier equipo terrestre previsto de boquillas adecuadas. Los mejores resultados se aseguran con la aspersión en las horas frescas del día. Alternar con fungicidas de diferente modo de acción.

### **RECOMENDADO PARA EL CONTROL DE:**

Tizón tardío (*Phytophthora infestans*)

Tizón temprano (*Alternaria solani*)

Alternariosis (*Alternaria alternata*)

Mancha púrpura (*Alternaria porri*)

### **CULTIVOS:**

Papa (*Solanum tuberosum*)  
Tomate (*Solanum lycopersicum*)  
Cebolla (*Allium cepa*)

**DOSIS:** 1,5 -1,75 L PC/Ha

**PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** 24 horas

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA (PERÍODO DE CARENIA):** Papa 7 días, Tomate y Cebolla 3 días.

**COMPATIBILIDAD:** Puede aplicarse en mezcla con insecticidas y fungicidas neutros de uso común. No realizar mezclas con productos de reacción fuertemente alcalina. Para la mezcla con otros plaguicidas deben realizarse pruebas previas que demuestren la compatibilidad entre los productos y de la mezcla con el cultivo.

**FITOTOXICIDAD:** No produce fitotoxicidad en los cultivos si se siguen las indicaciones para su uso.