

### Masat parambrojtese:

- Mbjajeni ne vende te sigurta dhe te paarriteshme nga femijet.
- Ruajeni ne vende te thata dhe te fresketa, larg ushqimeve dhe pijeve per njerezit si dhe ushqimeve per blegtorine.
- Gjate punes perdor paisje mbrojtese: kominoshe, doreza, maska, syze.
- Evitoni kontaktet e syve dhe te lekures me preparatin.
- Evitoni thithjen e avujve te preparatit me organet e frymemarrjes gjate pregatitjes se solucionit sperkatese dhe gjate sperkatjes.
- Gjate perdorimit te tij mos ha e mos pi uje dhe duhan.
- Ne perfundim te punes lani paisjet mbrojtese, mjetet sperkatese, duart dhe pjeset e ekspozuara te trupit.
- Beni shkaterrimin e ambalazhit sipas rregullave ne fuqi.

### Udhzime per ndihmen e pare dhe keshilla per mjekun:

- Ne rast gellitje, marrje me organet e frymamarrjes dhe me lekuren shkakton keto shenja helmimi: dermatit, konjuktivit, vjellje, diare, apati.
- Ne rast demtimi kerconi ndihme mjekesore ne qendren spitalore me te afert dhe tregojni mjekut etiketen.
- Nuk njihet antidot specifik. Mjekimi simptomatik.

**Ndikimi ne ekosistem:** Mesatarisht helmues per gjitarët. Mesatarisht helmues per zogjtë. Pak helmues per bletët. Mesatarisht helmues per peshqit dhe per jovertebrorët ujorë. Mos ndotni ujrart dhe basenet ujore me produktin ose ambalazhin e tij..



www.zenithcropsciences.com

### Prodhues:

Zenith Crop Sciences Bulgaria Ltd



"1 DEMSHEM" - "IRRITANT" - "1 DEMSHEM  
PER MJEDISIN" (N).  
Frazat e rrezikut (R): R36, R51, R53.  
Frazat e sigurise (S): S26, S35, S39, S57.



# NASA SL

## HERBICID TOTAL

me bazë Glifosati

Lenda vepruese: 36 % Glifosate  
Formulimi: Koncentrat i tretshem në ujë (SL)



### Perdorimi:

NASA SL eshte nje herbicid i pas mbirrjes, me veprim total, duke luftuar si barerat gjethegjera ashtu edhe ato gjethegushta ne periudhen e rritjes aktive. Pas marrjes nga gjethet, ai qarkullon me lengjet bimore ne te gjitha pjeset, e vecanerisht ne ato nenetokesore. Nuk le mbejte ne toke, prandaj tokat e trajtuara mund te mbillen pak dite pas trajtimit me te gjitha llojet e kulturave. Keshtu ai mund te perdoret perpara mbjelljes se perimeve, panxharit, grurit dhe te lashtave te tjera, orizit, livadheve, fidanishteve, farishteve, etj. Trapiantimi i fidanave dhe mbjellja e farerave te behet te pakten 48 ore pas trajtimit. Perdoret ne luftimin e barerave te keqia ne agrume, farore, berthamore, ullinj, vreshta, trendafilishte, etj. Nuk rekomandohet ne pemtoret dhe vreshtat e reja. Pervec bujqesise ka gjetur perdorim edhe ne luftimin e barerave ne bordura dhe anet e rrugeve, midis shinave hekurudhore dhe mjedisve te tjera, ku prania e barerave eshte shqetesuese.

### Doza e perdorimit:

6-12 lit preparat/ha, duke perdorur 400-600 litra uje, ne vartesi te zhvillimit te barerave te keqia.

Kunder barerave te keqia nje vjecare si: *Rumex hyumenosepalus*, *Cyperus spp.* *Cirsium arvense*, *Sorghum halepense*, me 6 lit preparat/ha.

Kunder barerave mesatarisht rezistente si: *Artemisia spp.*, me 8 lit preparat/ha.

Kunder barerave rezistente doza mund te shtohet: per graminoret 10 lit preparat/ha, per *Convolvulus spp.* 12 lit preparat/ha.

### Verejtje per perdorimin:

Shmangni kontaktin e pikave sperkatese me kulturat e tjera bujqesore

Mos sperkatni ne dite me ere.

Mos trajtoni barerat e keqia te cilat vuajne nga strese te ndryshme si thatesia, te ftohtit etj.

Nuk perziehete me produkte te tjera me reaksion alkaline ose acid.

Perdoret ekskluzivisht ne kohen dhe per qellimet e parashikuara ne kete etikete. Cdo perdorim tjetër do te ishte me reziqe.

Perdoruesi mban pergjegjesi per demet qe mund te shkaktohen nga perdorimi ndryshe nga rekomandimet e kesaj etikete.

### Fitotoksiciteti:

Nuk aplikohet

Karenca: Nuk aplikohet

Magazini: Preparati ruhet ne vende te erreta pa diell dhe pa lageshti, ne

temperatures -5 deri ne 35 o C.

Numri Regjistrimit: 45-1956-2012

Data e regjistrimit: 31-12-2012

# 20 x 1 Liters

Data e prodhimit: Printed on cap  
Afati i ruajtjes: 5 vjet