

# TOP PLUS 70 WP

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE

“KLASA 2”. Xn.



"I DEMSHEM"



N- I DEMSHEM PER MJEDISIN

Frazat e rrezikut: R20, R43, R50, R53, R68. Frazat e sigurisw: S2, S36/37, S46, S60, S61.

TOP PLUS 70 WP është fungicid sistemik me veprim kurativ dhe parambrojtes me spekter të gjere veprimi per luftimin e semundjeve të ndryshme keputdhore në kulturat bujqesore. Merret si nga pjeset e gjelbera ashtu edhe nga sistemi rrenjor duke qarkulluar në të gjithë bimën.

Permbajtja: Thiophanate methyl 70% Formulimi: Pluhur i lagshem (WP)

## Masat parambrojtese:

- Mbajeni në vende të sigurta dhe të paaritshme nga femijet;
- Ruajeni në vende të thata dhe të fresketa, larg ushqimeve dhe pijeve për njerëzit si dhe ushqimeve për blegtorinë;
- Evitoni kontaktet e zgjatura të syve dhe lekures me preparatin;
- Evitoni marrjen e preparatit me organet e frymemarrjes gjatë përgatitjes së solucionit sperkates dhe gjatë sperkatjes;
- Gjatë përdorimit të tij mos ha e mos pi ujë dhe duhan;
- Gjatë punës përdor paisje mbrojtëse: kominoshe, doreza, maska, syze;
- Në perfundim të punës lani duart dhe pjesët e ekspozuara të trupit si dhe paisjet mbrojtëse, mjetet sperkatese;
- Asgjësimi i ambalazheve të behet sipas rregullave në fuqi.

## Udhëzime për ndihmën e parë dhe keshilla për mjekun:

- Lani pjesët e kontaminimeve të lekures dhe membranat mukozë menjëherë me ujë të bollshëm e sapun.
- Në rast se është gëlltitur preparati, provokoni të vjella.
- Mos i jepni të demtuarit substanca absorbuese si qumësht, vaj, alkool, etj. Jepni të demtuarit qymyr aktiv.
- Nxirreni të demtuarin në ajër të pastër, në rast të fiktiv vendoseni atë në një pozicion anësor duke i dhënë kokës pas, bëni frymemarrje artificiale nëse nuk merr frymë.
- Në rast helmimi, kerkoni menjëherë ndihmë në qendren me të afert spitalore duke i treguar mjekut etiketën e këtij produkti.
- Antidot specifik nuk njihet. Mjekimi simptomatik.

## Perdorimi:

**Ne domate, spec, patllixhan, tragull, etj.**, për kontrollin e hireve (*Erysiphe spp.*), fuzariozave (*Fusarium spp.*), kalbezimit gri (*Botrytis cinerea*), verticiliozes (*Verticillium spp.*), kalbezimit të bardhë (*Sclerotinia spp.*), njollosjes së gjetheve (*Cladosporium spp.*) dhe antraknozave, me 100 gr/100 lit ujë. Trajtimet fillojnë me shfaqjen e simptomave të para.

**Ne Shalqin**, kundër fusariozes në farishte, me 85 gr/100 lit ujë, duke përdorur 3-4 litra/m<sup>2</sup> solucion. Kundër fuzariozes në fushe, me 85 gr/100 lit ujë, duke trajtuar bimët individualisht me 200-300 gr solucion për rrenjë, duke e persertur 3-4 here gjatë vegetacionit..

**Ne sallate laker e lulelaker**, përdoret për kontrollin e fusariozes, hirit dhe kalbezimeve, me 80 gr/100 lit ujë, me shfaqjen e simptomave të para.

**Ne fasule dhe bizele**, për kontrollin e hirit (*Erysiphe polygona*), sclerotinias (*Sclerotinia spp.*), verticiliozes (*Verticillium spp.*) dhe

antraknozës (*Colletotrichum spp.*), me 80 gr/100 lit ujë, me shfaqjen e simptomave të para.

**Ne pemët frutore berthamore**, për kontrollin e kalbezimit (*Sclerotinia laxa*), duke përdorur 75 gr preparat/100 lit ujë. Trajtimi i parë behet kur kanë rënë 75 % të petaleve. Për luftimin e hirit me 70gr//100 lit ujë.

**Ne molle e dardhe**, për kontrollin e kromave (*Venturia spp.*), me 70 gr/100 lit ujë, nga fillimi i çeljes së sythave vegetative. Për luftimin e *Septoria spp.*, me 70 gr/100 lit ujë, me çeljen e sythave lulore. Për kontrollin e hirit (*Podospaera leucotricha*) përdoren 100 gr/100 lit ujë, nga fillimi i çeljes së sythave vegetative deri në rritjen e plote të lastareve, çdo 10-14 dite.

**Ne hardhi**, kundër kalbezimit gri (*Botrytis cinerea*), me 100 gr/100 lit ujë, duke filluar nga lulezimi i plote deri 3-4 javë para vjeljes së prodhimit. Për kontrollin e hirit (*Uncinula necator*) përdoret me 100 gr/100 lit ujë. Trajtimet fillojnë që nga dalja e 2-3 gjetheve, dhe perseriten në vartesi të ecurisë së infeksionit.

**Ne agrume**, kundër kalbezimit, antraknozës (*Colletotrichum gloeosporoides*), me 100 gr/100 lit ujë.

**Ne bime zburuese**, kundër vrugjeve dhe semundjeve të tjera të gjetheve, hirit, kalbezimit të qafes e të rrenjeve, me 100-200 gr/100 lit ujë.

**Për trajtimin e frutave pas vjeljes:** Frutat pas vjeljes zhyten për 1-5 min. në solucion 0.05-0.1 %.

## Verejtje për përdorimin:

Përzihet me shumicën e fungicideve, insekticideve, acaricideve, rregullatorët e rritjes dhe ushqimeve gjethore. Nuk përzihet me lëngun bordolez, sulfatin e bakrit dhe me produktet e tjera alkaline. Mos kryej me shumë se dy trajtime gjethore për sezon.

## Fitotoxiciteti:

Nuk është fitotoksik kur përdoret me dozat dhe në kulturat e rekomanduara.

## Karenca

Rrush për vete 35 dite. Kulturat e tjera 14 dite.

## Ndikimi në ekosistem:

Helmues për bletet. Njoftoni bletëritesit para se të kryen trajtimet. Helmues për peshqit. Mos ndotni ujrat dhe basenet ujore me produktin ose ambalazhin e tij.

## Magazinimi:

Ruhet në vende të errta, të fresketa dhe në ambalazh origjinal.

Nr dhe data e regjistrimit: **599, datë 06.07.2015;**

Sasia neto: **ADD HERE THE NET WEIGHT**

Data e prodhimit: **TETOR 2015**

Periudha e ruajtjes: **3 vjet;**

Emri dhe adresa e fabrikuesit të PMB-se: **Zenith CropSciences Bulgaria. Asenovgradsko Shose, 4009 Plovdiv, Bulgaria.**

Emri dhe adresa e Aplikantit: **Zenith CropSciences Bulgaria. Asenovgradsko Shose, 4009 Plovdiv, Bulgaria.**