

CUPROSATE GOLD M 72 WP

“KLASA: 3”

“KUJDES”

Fungicid specifik, me veprim te fuqishem e te shpejte sistemi dhe kontakti per luftimin e vrugjeve

Lenda vepruese: *Cymoxanil 8% + Mancozeb 64%*

Formulimi: *Pluhur i lagshem (WP)*

Masat parambrojtese:

- Mbajeni ne vende te sigurta dhe te pa arriteshme nga femijet.
- Ruajeni ne vende te thata dhe te fresketa, larg ushqimeve, pijeve dhe ushqimeve per blegtorine.
- Evitoni kontaktete zgjatura te syve dhe lekures me preparatin.
- Evitoni marjn e preparatit me organet e frymemarrjes gjate pregatitjes se solucionit sperkates dhe gjate sperkatjes.
- Gjate perdorimit mos ha e mos pi uje dhe duhan.
- Gjate punes per dor paisje mbrojtese: kominoshe, doreza, maska, syze.
- Ne perfundim te punes lani duart dhe pjeset e ekspozuara te trupit, si dhe paisjet mbrojtese dhe mjetet sperkatese.
- Asgjesimi i ambalazheve te behet sipas rregullave ne fuqi.

Udhezime per ndihmen e pare dhe keshilla per mjekun:

- Ne rast kontakti me lekuren ose mukozat, lahuni me uje te bolleshem dhe sapun.
- Ne rast thithje te tretesires sperkatese me organet e frymemarrjes, i aksidentuari cohet ne nje mjedis te ngrohte dhe te ajrosur
- Ne rast helmimi, kerkoni menjehere ndihme ne qendren me te afert spitalore duke i treguar mjekut etiketen e ketij produkti. Nuk njihet antidot specifik. Mjekimi sipas simptomave.

Perdorimi:

Eshte fungicid sistemi dhe kontakti me veprim te dyfishte, duke frenuar zhvillimin e micelit te kerpudhes (Cymoxanili) dhe frenues per mbirjen e sporeve te kerpudhave (Mancozebi). Perdoret ne trajtimet preventive dhe ne ato kurative. Pas trajtimit Cymoxanil deperton ne indet bimore brenda 6 oreve dhe, ne saje, te levizjes citotropike e translaminare merret nga miceli i kerpudhes duke penguar zhvillimin e micelit, ndersa Mankozebi ka veprim te zgjatur dhe te larte biologjik si dhe ne saje te permbajtjes se Manganit dhe Zingut ka veprim te larte stimulues mbi masen vegetative.

Ne hardhi: Kunder vrugut (*Plasmophora viticola*). Trajtimet fillojne kur cfaqet reziku i infeksionit nga vrugu, pra kur lastarte kane aritur gatesine 10 cm dhe kur kemi reshje dhe lageshti i te mjaftueshme ne gjethe. Trajtimet ne fazat e para jane gjithashtu te efektshme edhe kunder Eskoriozes. Doza e perdorimit 150-200 gr/100 lit uje. Ne vartesi te infeksionit trajtimet mund te perseriten cdo 7-10 dite. Kryhen deri ne 4 trajtime.

Ne domate: Kunder vrugut (*Phytophthora spp*), me 150-200 gr/100 lit uje. Trajtimet perseriten cdo 7-10 dite.

Ne spec: Kunder (*Phytophthora capsici*), me 1.5-2 kg/ha, duke kryer deri 3 trajtime pas mbjelljes se fidanit ne fushe.

Ne duhan: per luftimin e (*Phytophthora spp dhe Peronospora tabaccina*), me 200-250 gr/100 lit uje.

Ne bimet zbukuruese: Per luftimin e vrugjeve te ndryshme shkaktuar nga kepurdhat e gjinise *peronosporae*, me 150-200 gr/100 lit uje.

Verejtje per perdorimin:

- Perzihet me produktet e tjera me perjashtim te atyre me reaksion alkaline.
- Nuk duhet te perdoret ne kultura qe kane kaluar strese nga temperaturat e uleta, uitja e tepert, thatesire e te tjera.

Ndikimi ne ekosistem:

- Nuk eshte helmues ndaj bleteve
- Eshte helmues ndaj peshqeve prandaj mos ndotni ujrat me kete produkt ose ambalazhet e tij.

Karenca:

10-14 dite per te gjithethe kulturat e rekomanduara.

Magazinimi:

Ruhet ne vende te sigurta, pa lageshti, dhe ne temperature 5 deri 35 grade celsius

Nr dhe data e regjistrimit: **446; 16/3/2012**

Sasia neto: **25 kg**

Data e prodhimit: **06/2014**

Periudha e ruajtjes: **3 vjet;**

Emri dhe adresa e fabrikuesit te PMB-se: **ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD. 58 B, SOLUNSKA STR., APT.1, SOFIA, BULGARIA**

Distributor: **SHEGAJ –AGR shpk**