

**! ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.**

## **FUERZENTH 43 SC**

FUNGICIDA- DITIOCARBAMATO  
**MANCOZEB**

### **PRECAUCION**

**ANTÍDOTO: NO TIENE**  
**DENSIDAD: 1.24g/ml a 20 ° C**

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



#### **USO AGRONÓMICO**

#### **MODO DE ACCIÓN:**

FUERZENTH 43 SC es un fungicida de contacto que impide la producción de ATP (Trifosfato de Adenosina) en la célula fungosa, sustancia vital en el metabolismo del hongo, ocasionando su destrucción e inhibiendo el desarrollo del tubo germinativo del hongo. Trabaja en diferentes sitios vitales de la célula de los hongos, haciendo prácticamente imposible que estos microorganismos puedan desarrollar resistencia al producto. Por contener manganeso y zinc, corrige carencias de estos elementos sirviendo como fertilizante.

#### **EQUIPO DE APLICACIÓN:**

Aplique con cualquier equipo de aspersión: bomba de mochila manual, de motor, equipo acoplado al tractor o con avión. Antes de aplicar verifique el estado de su equipo y calibre adecuadamente. Utilice boquillas cónicas procurando mojar el follaje. Recuerde lavar el equipo de aplicación antes y después de cada aplicación.



#### **FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:**

Llene el tanque a la mitad con agua y vierta la dosis recomendada de FUERZENTH 43 SC, mezcle bien con una varilla limpia y complete el volumen de la mezcla que se va a aplicar.

Si utiliza mezclas de FUERZENTH 43 SC, con otros pesticidas, haga premezclas por separado y luego vierta al tanque la mezcla.

La preparación de la mezcla en cultivo de banano para la obtención de una buena emulsión debe efectuarse de la siguiente manera:

- Mezclar la totalidad del aceite a utilizar con la dosis completa de FUERZENTH 43 SC y agitar.
- Agregar la mitad del volumen de agua a utilizar (NO AGREGAR EMULSIFICANTE) y luego agitar.
- Al obtener la emulsión, vierta el resto de agua a utilizar, FUERZENTH 43 SC contiene suficiente emulsificante para lograr emulsificar un máximo de 5 litros de aceite por cada litro de FUERZENTH 43 SC.

Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificadores, cubetas graduadas, paleta de agitación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día. Después de ser usado, el equipo debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón. Debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y lentes durante el lavado del equipo de aplicación.



#### **RECOMENDACIONES DE USO:**

##### **Nombre Común**

Sigatoka negra  
Sigatoka amarilla  
Mancha negra  
Antracnosis  
Fusarium

##### **Nombre Científico**

Mycosphaerella fijiensis  
Mycosphaerella musicola  
Diplocarpon rosae  
Colletotrichum gloeosporioides  
Fusarium spp

#### **CULTIVOS:**

##### **Nombre Común**

Banano  
Plátano  
Papa  
Tomate  
Tabaco  
Ornamentales, y Césped

##### **Nombre Científico**

Musa sapientum  
Musa paradisiaca  
Solanum tuberosum  
Lycopersicon esculentum  
Nicotiana tabacum

#### **DOSIS RECOMENDADAS:**

##### **Dosis:**

2-3 Litros/ha

#### **INTERVALO DE APLICACIÓN:**

10 – 15 días

#### **INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:**

10 días.

#### **INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:**

Espera que el rocío de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

#### **FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado.

**COMPATIBILIDAD:**

No se conocen fitoincompatibilidades.. Es compatible con la mayoría de insecticida, acariadas y fungicidas. No compatible con reguladores de crecimiento.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** Almacénesse y transpórtese el producto en lugares frescos. Secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. Manténgalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado. No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes ni semillas. Almacénelo bajo llave en un lugar fresco.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.**

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Dolor de cabeza, náuseas, mareos, inquietud y ansiedad notorios. Espasmos musculares, debilidad, temblor, incoordinación, vómito, calambres abdominales y diarrea.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**POR INGESTIÓN:** Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

**POR INHALACIÓN:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

**NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:**

No tiene antídoto y el tratamiento es sintomático y de sostén

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).  
TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.  
TEL/681-2913/6928

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

**TÓXICO PARA PECES**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES MANEJO DE ENVASES VACÍOS.**

**EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perforarlos y depositarlos en un centro de acopio autorizado por las autoridades. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTÍA:**

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

**DISTRIBUIDO POR:**

**ZENITH AMERICAS S.R.L**

Ave. Winston Churchill, esquina José Amado Soler, Plaza Fernández II, módulo 34B, Santo Domingo, República Dominicana.

**EXPORTADO POR:**

**ZENITH CROP SCIENCES S.A**

Lichtensteinaubendt 36, Fl-9490, Vaduz Liechtenstein

**FABRICADO POR:**

AGRIA S.A . Plovdiv 4009, Asenovgradsko Shose, Bulgaria. E-mail: agria@agria

| PAÍS                  | NO. REG. | FECHA DE REG. |
|-----------------------|----------|---------------|
| BULGARIA.             |          |               |
| REP. DOM.             |          |               |
| NUMERO DE LOTE:       |          |               |
| FECHA DE FORMULACIÓN: |          |               |
| FECHA DE VENCIMIENTO: |          |               |