

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Grupo Químico: El ingrediente activo Mancozeb pertenece al grupo químico de los alquilenbis (ditiocarbamatos). El ingrediente activo Cimoxanilo pertenece al grupo químico de las oximas de cianoacetamida.

Evitar que el producto entre en contacto con la piel, ojos y ropa. Evitar la inhalación del polvo. No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto. Lavarse las manos prolijamente luego de manipular el producto.

Durante la preparación del producto: Utilizar overol impermeable, botas de goma, guantes de goma, mascarilla con filtro y antiparras.

Durante la aplicación: Utilizar overol impermeable, botas de goma, guantes de goma, mascarilla con filtro y antiparras.

Información Ecotoxicológica: No es tóxico para aves ni abejas. Tóxico para peces y organismos acuáticos. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD NO INGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO

Síntomas de Intoxicación: La inhalación del polvo puede generar irritación del tracto respiratorio superior. El contacto con los ojos puede causar irritación y puede ser sensibilizador para la piel.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Sacar inmediatamente la ropa contaminada y lavar la zona de la piel afectada con abundante agua. En caso de ser necesario, buscar atención médica. La ropa contaminada debe ser lavada antes de volver a utilizarla.

Contacto con los ojos: Lavar de forma inmediata con abundante agua limpia, incluso bajo los párpados, por al menos 15 minutos. En caso de utilizar lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Si la irritación persiste, buscar atención médica.

Inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco. En caso de ser necesario, dar respiración artificial u oxígeno. En caso de exposición severa, buscar atención médica inmediata.

Ingestión: Dar a beber 1 a 2 vasos de agua. No inducir el vómito sin supervisión de un médico. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Buscar atención médica.

Antídoto: No tiene antídoto conocido.

Tratamiento Médico de Emergencia: Tratamiento sintomático y de soporte.

Teléfonos de emergencia: RITA_CHILE: (2) 2777 1994.

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener bajo llave y fuera del alcance de los niños. Mantener solamente en envases originales debidamente cerrados y etiquetados, separados de cualquier tipo de alimento o pienso. No exponer envases a calor, llama o luz solar directa.

RAPIZENT**FUNGICIDA
POLVO MOJABLE (WP)**

RAPIZENT es una combinación de un fungicida sistémico con uno de acción de contacto, utilizado para control de mildiú, botritis y tizón, en cultivos de uva, ajo, cebolla, papa y tomate, como se aprecia en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICION:

Mancozeb(*).....64% p/p (640 g/kg)
Cimoxanilo(**).....8% p/p (80 g/kg)
Coformulantes c.s.p.....100% p/p (1 kg)

(*) Complejo (polimérico) de etilenbis (ditiocarbamato) manganeso con sal cínquica.
(**)1-(EZ)-2-ciano-2-metoxiiminoacetil]-3-etilurea.

Autorización del
Servicio Agrícola y Ganadero
Nº 2.857

<<LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO**

Lote Nº: Fecha Venc.:

Cont. Neto: X Kg.

Fabricado por:
ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD.
Calle Dimitar Manov 75-83, 1408 Sofia
Bulgaria

Importado y Distribuido por:

INSTRUCCIONES DE USO:

RAPIZENT es una combinación de un fungicida sistémico con uno de acción de contacto, utilizado para control de mildiú, botritis y tizón, en cultivos de uva, ajo, cebolla, papa y tomate, como se aprecia en el cuadro de instrucciones de uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES
Vid (uva de mesa, para vinificación y pisquera)	Mildiú de la vid (<i>Plasmopara vitícola</i>)	1,5	Se puede aplicar en forma preventiva, cuando existen condiciones favorables al desarrollo de la enfermedad o cuando han aparecido las primeras manifestaciones de la enfermedad. Repetir la aplicación, respetando un intervalo de 7 a 14 días, durante brotación, pre y post floración hasta crecimiento de racimo. Máximo 6 aplicaciones por temporada.
Ajo Cebolla	Mildiú (<i>Peronospora destructor</i>)	1,5	Aplicar cuando las condiciones son favorables al desarrollo de la enfermedad. Repetir cada 7 a 10 días mientras sea necesario. Máximo 4 aplicaciones por temporada.
Papa	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans A1</i>) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1,5	Aplicar en forma preventiva en plantas de entre 5 y 15 cm. Se puede repetir cada 7 a 10 días, mientras sea necesario. No más de 6 aplicaciones por temporada.
Tomate	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans A1</i>) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1,5	Aplicar en forma preventiva, después del trasplante, cuando las plantas estén bien arraigadas o desde emergencia en siembra directa. Repetir cada 7 a 10 días mientras sea necesario. No más de 5 aplicaciones por temporada.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y agregar la cantidad recomendada del producto, luego completar con agua hasta el nivel requerido, manteniendo siempre el sistema agitador funcionando.

Métodos de Aplicación: Aplicar mediante aspersión con equipos convencionales. Mojamiento recomendado:

Vid: 500 – 1500 L de agua/Ha. según el estado fenológico del cultivo.

Ajo, Cebolla: 400 L de agua/Ha.

Papa, Tomate: 500 – 1000 L de agua/Ha. según el estado fenológico del cultivo

Incompatibilidad: Es compatible con la mayoría de los pesticidas y fertilizantes utilizados, a excepción de aquellos con reacción alcalina.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico cuando se usa según recomendaciones. Se aconseja realizar una prueba local, ya que puede haber influencia del clima.

Tiempo de Reingreso al área tratada (personas y animales): Se debe esperar un tiempo de resguardo de 24 horas.

Período de Carencia: Uva: 10 días. Ajo: 7 días. Papa, cebolla y tomate: 7 días.

NOTA AL COMPRADOR:

El producto en su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, garantizándose el porcentaje de Ingrediente Activo de envases debidamente sellados. Como su almacenamiento y aplicación escapan de nuestro control directo, declinamos toda responsabilidad por riesgos eventuales derivados de su aplicación y almacenaje.



CUIDADO

