

TIGRE 10,8 CE HERBICIDA

INGREDIENTE ACTIVO: 10,8 % QUIZALOFOP-P-ETIL:

FORMULACIÓN: CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)

GRUPO QUÍMICO: QUINOXALINA



RECOMIENDACIONES DE USO: Herbicida recomendado para el control de malezas gramíneas anuales y perennes, en pos emergencia en diversos cultivos. Producto sistémico y selectivo, típicamente antigramíneo, se absorbe por el follaje y se mueve a través del xilema y el floema para acumularse en los tejidos meristémicos apicales y brotes subterráneos, donde actúa. Inhibe la enzima acetil - carboxilasa y afecta la síntesis de los lípidos causando una completa destrucción de la célula.

Aplicar en pos emergencia cuando las malezas están en activo crecimiento, fase de 2 a 4 hojas, los tejidos jóvenes en expansión y los meristemos son muy susceptibles. A las 48 horas de la aplicación, la planta cesa su crecimiento y comienza la manifestación de los síntomas, las hojas de las malezas toman un color amarillento, después adquieren un color marrón rojizo y se secan. La muerte de las plantas ocurre entre 10 - 20 días en dependencia de la susceptibilidad de las especies indeseables.

Utilizar equipo terrestre convencional. Hacer pre mezcla con la cantidad indicada del producto y suficiente agua para su dilución, luego verter dentro del tanque medio de agua, agitar bien y completar el volumen hasta el llenado.

CULTIVOS A TRATAR:

HORTALIZAS: Ajo (*Allium sativum*), Berenjena (*Solanum melongena*), Cebolla (*Allium cepa*), lechuga (*Lactuca sativa*), hortalizas del género *Brassica*. Tomate (*Solanum lycopersicum*), Pimiento (*Capsicum annuum*) y otros.

LEGUMINOSAS: Soya (*Glycine max*), Frijol común (*Phaseolus vulgaris*), Frijol carita (*Vigna spp*) y maní (*Arachys hypogaea*)

GRAMÍNEAS QUE CONTROLA:

<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina
<i>Echinochloa colona</i>	Pata de cao
<i>Rottboellia cochinchinensis R. exaltata</i>	Sancaraña
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Don Juan de Castilla
<i>Cenchrus echinatus</i>	Guizazo.
<i>Urochloa fasciculata (Brachiaria extensa)</i>	Gambutera
<i>Cynodon dactylon</i>	Hierba fina
<i>Panicum maximum</i>	Hierba de guinea
<i>Sorghum halepense (Holcus halepenses)</i>	Don Carlos, Cañuela
<i>Digitaria adscendens</i>	Don Juan de Castilla
<i>Leptochloa panicea</i>	Plumilla

DOSIS RECOMENDADAS: Utilice entre 0.3- 0.5 L PC/ ha.

NÚMERO DE APLICACIONES: Una o dos, de acuerdo con la infestación de nuevos brotes de malezas, la segunda puede hacerse en machoneo dirigida al control de focos.

PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 15 días.

COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con la mayoría de los fungicidas, insecticidas y fertilizantes, excepto con productos a partir del cobre.